

مستخلص

صافية، ولدا. 2014. دراسة أيتنوبوتاني للنبات الطبية لدى مجتمع المنطقة أرجاسا بجزيرة كانجيان مدينة سومنب مادورا. البحث الجامعي. الشعبة علم الحياة لكلية العلوم و التكنولوجيا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول : د. إيكو بودي مينارنا الماجستير. المشرف الثاني : أنديك ويجاينطا الماجستير.

الكلمة المفتاحية : إيتنوبوتاني، النبات الطبي، جزيرة كانجيان.

المعرفة باستفادة النبات هي شيء مهم جدا. بالإضافة على كثرة أنواع النبات الموجودة، كانت استفادتها قليلة. فتعتبر النبات كالعشب الذي لازم عليه أن يُحقق مرارا. لذا، قيم بالبحث في إيتنوبوتاني للنبات الطبية لدى مجتمع المنطقة أرجاسا. يهدف هذا البحث لمحافظة المعرفة المحلية و استفادة النبات كالدواء لدى مجتمع المنطقة أرجاسا جزيرة كانجيان مدينة سومنب مادورا.

قيم هذا البحث بشهر فبراير إلى مارس 2014 في القرية أرجاسا و القرية لوك جنج جنج و القرية بسرمان بمنطقة أرجاسا مدينة سومنب مادورا. نوع هذا البحث هو البحث الوصفي الكمي بطريقة المسح و المقابلة بأسئلة شبه المقننة. (semi structural interview) مجتمع هذا البحث هو مجتمع المنطقة أرجاسا بجزيرة كانجيان مدينة سومنب مادورا. تعيين المجيب باستخدام طريقة العينة الهادفة التي تتكون من المجيب الرئيسي و المجيب غير الرئيسي. أما مجيبين هذا البحث مماثلة بثلاثة قرى فهي: 21 مجيبين لقرية أرجاسا و 19 مجيبين من لقرية لوك جنج جنج و 23 مجيبين لقرية بسرمان.

أشار نتيجة البحث أيتنوبوتاني أن توجد 52 انواع (species) النبات من 27 أحياء (famili) التي مستفيدة كالدواء. نوع النبات التي تستفيدها مرارا هي النباتات الجذمورية من قبيلة زنجبيراجياي (Zingiberaceae) ككركم بيت (*Curcuma zadoaria berg.*) 5% و كركم (*curcuma*) 8% (*Curcuma domestica val.*) و لمبويانج (*Zingiber zerumbet L.*) 5% و زنجبيل (*Zingiber officinale Roxb.*) 4% و قبيلة بيبراجياي (*Piperaceae*) سيره (*Piper betle*) 7% و أستراجياي (*Asteraceae*) بالونتاس (*Pluchea indica L.*) 4% و قبيلة جوجرتاجياي (*Cucurbitaceae*) باري (*Momordica carantina L.*) 4%. عضو النبات مستخدم في الدواء التقليدي هو جذر ب 5% و قضيب ب 6% و ثمر ب 11% و زهر ب 4% و جلد ب 4% و جذمور 30%. النتيجة الأعلى هي ورق ب 34% و النتيجة المنخفضة هي سلق و عجمة ب 3%. طريقة استفادتها بالطرائق المختلفة و هي تشرب بعد تسلق ب 34% و تشرب بدون تسلق ب 25% و بالتطبيق ب 13% و بطريقة أخرى (بالتقطير و بالتصنيع). و تنال بالطرائق المختلفة و هي بشراء في السوق ب 21% و بالزراعة ب 41%.