

## المخلص

ترغونوا، أولي الأمر دوي، 2013، مصنع بنية المجتمع داون المفتوحة والمغلقة على حامل وكذلك الاستفادة من المجتمع في تامن هوتان ربا (TAHURA) R. Soerjo Cangar المدينة باتو. المؤدب: الدوكتار رتنو شوصلواتي المجستير و الدوكتار الحاج مندر العبدن المجستير.

الكلمة : مجتمع, مصنع التحتية, موقف الغابات, TAHURA Cangar

تنوع الموارد البيولوجية في الغابات الاستوائية على سبيل المثال لا الأنواع النباتية الخشبية أو مزمنة، ولكن هناك أيضا أقل الغطاء النباتي مع مجموعة متنوعة من الأنواع عالية. النباتات هي النباتات التي تعيش أسفل على أرض الغابة، وتغطي الأرض. ويعتقد أن تم تشكيل هيكل الأشجار يؤثر على وجود المحطة التي تقع على أرض الغابة. TAHURA R. Soerjo Cangar هو خدمة مناطق الغابات الحفظ الإقليمية باتو التي تضم محمية طبيعية Arjuno Lali Jiwo . العوامل التي تسبب ضررا مثل استئصال الغابات والتنمية رقابة ضعيفة. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد بنية المجتمع النباتية وهذا النوع الذي كان سائدا في موقف المفتوحة والمغلقة، واستخدام أقل مصنع من قبل المجتمع.

وقد أجريت هذه الدراسة في آب سبتمبر 2012 في TAHURA R. Soerjo تم تقسيم الدراسة إلى قسمين موقع، وهي في مجال المواقف المفتوحة والمغلقة. هذا البحث هو وصفي الكمية البحث طريقة أخذ العينات belt transek . وقد لوحظت العوامل البيئية، من بين أمور أخرى، ضوء الارتفاع ودرجة الحرارة. وقد تم تحليل البيانات عن طريق حساب الكثافة، والتردد، وهيمنة (INP.) لنشر أنماط يتم تحليلها باستخدام فهرس التشتت واختبار خي مربع. وعلاوة على ذلك، لتشابه الطائفتين تم تحليلها باستخدام طريقة سورنسن.

العثور على 31 نوعا من البحوث تحت النباتات، 16 و 21 في المدرجات المغلقة في المدرجات مفتوحة. في المدرجات المغلقة والمفتوحة من مؤشر قيمة هامة من أعلى وجدت في نفس النوع، *Eupatorium odoratum* L. مع 93،63٪ و 73،72٪. نمط انتشار في موقف مغلق (5)، (619 وفتح 8)، (584)، تجمعت توزيع التوزيع. تشابه معامل 2 أماكن (QS) من المجموعات النباتية الموجودة في المدرجات المغلقة والمفتوحة هو 0.28. انخفاض استخدام النبات من قبل الجمهور والأعشاب والضروريات اليومية نسبة 60٪، "الناس الذين يعرفون إعادة فوائد النباتات دون نسبة فائدة 40٪. وبلغ مجموع الأشخاص الذين تمت مقابلتهم 50 شخصا، مع 29 نوعا من النباتات التي يمكن استخدامها تحت.