

الملخص

بحري، سامسول. ٢٠١٢ تأثير الجرعة شكل كينيتيلا (كينيتيلا اسياتيكا (لا) في المناطق الحضرية) إلى مستويات ديسموتاز الفائق (الاحمق) و (MDA) malondialdehyde الجرذ الأبيض الدماغ (الجرذ النرويجي) إناث، وهو ما أشعل ألوكسان المشرف الأول: الدكتور دره. بيناتول موختارمة، م.سي. الاشتراكية، المشرف الثاني: محمد امام الدين، م.ا.

كلمات البحث: غوتو كولا (كينيتيلا اسياتيكا (لا) في المناطق الحضرية) ، SOD، MDA، ألوكسان، وإناث الجرذ الأبيض.

وكان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تأثير غوتو جرعة كولا أشكال (كينيتيلا اسياتيكا (لا) في المناطق الحضرية) ومدة إدارة كولا شكل غوتو الجرعة (كينيتيلا اسياتيكا (لا) في المناطق الحضرية)، والتحقيق في التفاعل بين غوتو جرعة كولا أشكال (كينيتيلا اسياتيكا (لا) في المناطق الحضرية) على مستويات ديسموتاز الفائق (الاحمق ومستويات MDA malondialdehyde) الدماغ الفئران البيضاء (الجرذ النرويجي) ألوكسان التي يسببها الإناث.

هذه الدراسة هو البحث التجريبي باستخدام التصميم كامل العشوائية (CRD) غط مضروب يتكون من ٢ العوامل مع ٣ مكررات. العامل الأول في هذه الدراسة هي الجرعة من أوراق غوتو كولا وتتكون من الجرعات الثلاث هو شكل مقتطفات، الماء المغلي والطازجة. والعامل الثاني هو مدة الجرعة إدارة غوتو كولا ورقة (٢٨ يوما و ٤٢ يوما). (تم علاج الفئران في الدراسة كانت غير المعالجة (المراقبة السلبية) والفئران دون إقامة كينيتيلا اسياتيكا نخر (مراقبة إيجابية)، وأعطيت الفئران مقتطفات من كينيتيلا اسياتيكا نخر لمدة ٢٨ يوما و ٤٢ يوما، نظرا للفئران جديدة غوتو كولا نخر لمدة ٢٨ يوما و ٤٢ يوما، ونخر الفئران والمغلي المياه التي غوتو كولا لمدة ٢٨ يوما و ٤٢ يوما. وقد تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام اتجاهين انوفا. إذا كان التحليل يبين تأثير كبير، واصل بعد ذلك مع اختبار 1 HSD % .

نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن إدارة مختلف أشكال الدواء جرعة أشكال مثل غوتو كولا مقتطف، الأوراق الطازجة، والماء المغلي غوتو كولا يمكن أن تزيد من مستويات ديسموتاز الفائق (الاحمق) وتمنع مستويات (MDA) malondialdehyde الدماغ الفئران البيضاء (الجرذ النرويجي) ألوكسان التي يسببها الإناث. في حين أن مدة غوتو كولا (كينيتيلا اسياتيكا (لا) في المناطق الحضرية) ٢٨ أيام وأيام ٤٢، فضلا عن التفاعل بين أشكال غوتو جرعة كولا ومدتها الإدارة تؤثر على مستويات ديسموتاز الفائق (الاحمق) ومستويات (MDA) malondialdehyde الدماغ الفئران البيضاء (الجرذ النرويجي) من الإناث ألوكسان التي يسببها.